



මුත්‍ර මාර්ගයේ ආසාදන

Urinary Tract Infections (UTI)



වෛද්‍ය හර්ෂ අලුත්ගේ

Dr Harsha Aluthge

MBBS, FRACGP, DFM RCGP(UK)

General Practitioner

Greenvale Medical Centre

එසේම යම් ක්ෂුද්‍ර ජීවියෙක් හඳුනා ගතහොත් එයට වඩා සුදුසු ඖෂධ වර්ගය - උදා Antibiotics - කුමක්ද යන්නද රසායනාගාරය මගින් පරීක්ෂා කර වෛද්‍ය වරයාට දැනුම් දෙනු ලැබේ. මෙය Antibiotic Sensitivity Test ලෙස හඳුන්වයි.

මුත්‍ර ආසාදන ඉතා සුලභ රෝගී තත්වයකි. විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් කුඩා ළමුන් හා වයස්ගත අයට එය වැළඳීමේ ප්‍රවණතාව වැඩි ය. සෑම කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුට හා පිරිමින් 20 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුට කම පීටිනකාලය තුළ දී එක් වරක් හෝ මුත්‍ර ආසාදනයක් ඇති වන බව හඳුනාගෙන ඇත.

ඉහත රෝග ලක්ෂණ අතරින් උණ සිතල වෙවිලීම කොන්දේ වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ සමහර විට වකුගඩු ආසාදන නිසා ද ඇතිවිය හැකිය. එබැවින් එවැනි රෝග ලක්ෂණ පෙන්වයි නම් ඉක්මණින් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාගත යුතුය.

මුත්‍ර ආසාදන ඇතිවීමට හේතු

අපේ ශරීරයේ මුත්‍රා සාමාන්‍යයෙන් ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගෙන් තොර ය. මුත්‍රා මාර්ගයේ ආසාදන ඇතිවීමට නම් බැක්ටීරියා දිලීර හෝ වෛරස වැනි ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පිටතින් ඇතුළුවිය යුතුය. බොහෝ විට ඔවුන් ඇතුළුවන්නේ මුත්‍රා මාර්ගයෙනි. ඉතා කලාතුරකින් රුධිරය හරහා ද ඇතුළුවිය හැකි ය.

මුත්‍ර ආසාදන ඇති කරන ඉතාම සුලභ බැක්ටීරියාව වන්නේ Ecoli නමැති බැක්ටීරියාවයි. එය බොහෝ විට අපේ ගුද මාර්ගයේ සිට පිටතට පැමිණ මුත්‍රා මාර්ගය හරහා ශරීරයට ඇතුළුවේ.

තවද ලිංග ආශ්‍රිතව පැතිරෙන Chlamydia Mycoplasma වැනි ක්ෂුද්‍රජීවීන්ද මුත්‍රා ආසාදන ඇති කරයි. එවැනි ආසාදන වැළඳුණ අයගේ ලිංගික සහකරුවන්ද පරික්ෂාවට ලක් කර ප්‍රතිකාර ලබාගත යුතුය. එසේම අන් අයට ලිංගික සංසර්ගය මගින් පැතිරීම වැළැක්වීමට පියවර ගත යුතු ය.

මුත්‍ර ආසාදන ඇතිවීම සඳහා අවදානම් සාධක

සමහර පුද්ගලයන් මුත්‍ර ආසාදන ඇතිවීමට වැඩි අවදානමක් දරන බව පෙනීගොස් ඇත. එවැනි අය නම්

- කාන්තාවන් - විශේෂයෙන්ම ලිංගිකව සක්‍රීය අය. මක්නිසාදයත් කාන්තාවන්ගේ මුත්‍රා මාර්ගය සෙන්ටිමීටර් 4 ක් පමණ

කෙටි දිගකින් යුක්තවීම හා ගුද මාර්ගය හා මුත්‍රා මාර්ගය එකම තලයක කුඩා දුරකින් පිහිටීම නිසා ගුද මාර්ගය හරහා පිටතට පැමිණෙන බැක්ටීරියා මුත්‍රා මාර්ගයට පහසුවෙන් ඇතුළුවීමේ ඉඩ කඩ වැඩි නිසා ය.

- මුත්‍රා බට හෙවත් කැනීටර යොදා ඇති රෝගීන්
- දියවැඩියා රෝගීන්
- පුරුස්ථි ග්‍රන්ථියේ රෝග ඇති පිරිමින්
- මුත්‍රා පද්ධතියේ ආවේනික රෝග ඇති ළමුන්

මුත්‍ර ආසාදන ඇති බවට රෝග නිර්ණය කරගන්නේ කෙසේද?

ඉහත සඳහන් කළ රෝග ලක්ෂණ පවතින අයෙකුට රෝගය වැළඳී ඇති බවට සැක කරනු ලැබේ. එවන් අයෙකුගේ මුත්‍රා සාම්පලයක් පරීක්ෂා කිරීම මගින් ආසාදනයක් ඇති බව සහවුරු කරගත හැකිය.

මුත්‍ර ආසාදන සඳහා ප්‍රතිකාර හා වළක්වාගන්නා ක්‍රම

බොහෝ විට ප්‍රතිජීවක ඖෂධ හෙවත් "මගින් ප්‍රතිකාර කරනු ලැබේ. එසේම පහත සඳහන් ක්‍රම අනුගමනය කිරීමෙන් තීවර මුත්‍රා ආසාදන සෑදීම වළක්වා ගත හැකි ය.

- තීවර වතුර පානය හා අනෙකුත් දියර වර්ග වැඩිපුර පානය කිරීම
- මුත්‍රා මාර්ගය හා ගුද මාර්ගය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය පිරිසිදුව තබා ගැනීම
- මුත්‍රා කිරීමේ අවශ්‍යතාව ඇතිවූ විට මුත්‍රා පිටකිරීම (Without holding on)
- ලිංගික සංසර්ගයෙන් පසු මුත්‍රා පිටකර මුත්‍රාලය ගිස් කිරීම
- යෝනි මාර්ගය ආශ්‍රිත දිලීර රෝග (Thrush) ආදියට ඉක්මණින් ප්‍රතිකාර ලබාගැනීම

මීට අමතරව වැනි විවිධ පාන සමහර අය පාවිච්චි කරති. එවැනි ක්‍රම වල ප්‍රතිඵල සියයට සියයක් විද්‍යාත්මකව තහවුරු කර නැත.

අපේ මුත්‍රා මාර්ග පද්ධතිය ප්‍රධාන කොටස් කිහිපයකින් සෑදී තිබේ. වකුගඩු, වකුගඩු වලින් මුත්‍රා පිටගත ගෙන යන නාළය (Ureters) හා මුත්‍රාලය හා මුත්‍රා මාර්ගයයි.

මුත්‍ර ආසාදන ප්‍රභේද

- Urethritis - මුත්‍රා මාර්ගයේ ආසාදනය
- Cystitis - මුත්‍රාලයේ ආසාදන
- Pyelonephritis - වකුගඩුවහල ඇති වන ආසාදන

මෙයින් මුත්‍රාලයේ හා මුත්‍ර මාර්ගයේ ආසාදන වඩා සුලභ වන අතර වකුගඩු වල ආසාදන එතරම් සුලභ නොවේ. නමුත් කලාතුරකින් හෝ ඇතිවුවහොත් ඒවා අන් ආසාදන වලට වඩා ප්‍රබල රෝග ලක්ෂණ ඇති කරයි.

බොහෝ විට මුත්‍රා ආසාදන ඇති කරන්නේ බැක්ටීරියා මගිනි.

මුත්‍ර ආසාදන වල රෝග ලක්ෂණ

- මුත්‍රා දැවිල්ල
- මුත්‍රා කරන වාර ප්‍රමාණය වැඩිවීම
- මුත්‍රාලය අවට වේදනාව - යටි බඩ රුදාව
- මුත්‍රා සමග ලේ පිටවීම
- මුත්‍රා කළ පසු මුත්‍රාලය සම්පූර්ණයෙන් ගිස් නොවුණ බවක් දැනීම
- උණ සිතල වෙවිලීම
- කොන්දේ රුදාව

ඇඛැරතු

විදුලිකාර්මිකයන්

සහ පුහුණුවන්නන් අවශ්‍යයි

විමසන්න

සුපීන් - 0432 922 427