



කන් ආසාදන

Ear Infection



වෛද්‍ය හර්ෂ අලුත්ගේ

Dr Harsha Aluthge

MBBS, FRACGP, DFM RCGP(UK)

General Practitioner

Greenvale Medical Centre

කන් ආසාදන ඉතා සුලභ රෝගී තත්වයකි. විශේෂයෙන් කුඩා ළමුන්ගේ නිතර දක්නට ලැබෙන රෝගී තත්වයකි.

අපගේ කන ප්‍රධාන කොටස් තුනකින් සෑදී තිබේ.

01. පිටත කන Outer Ear - පිටතට පෙනෙන කන් පෙත්ත හා ශබ්දය කන් බේරිය කරා ගෙන යන නාලය (Ear Canal) මගින් පිටත කන සෑදී තිබේ.

02. මධ්‍ය කන Middle Ear - පිටතට කන හා මධ්‍ය කන කන් බේරිය (Ear Drum) මගින් වෙන් කරනු ලැබේ.

03. ඇතුළු කන Inner Ear - ශබ්ද තරංග විද්‍යුත් තරංග බවට පරිවර්තන කර ගොළයට සම්ප්‍රේෂණය කිරීම මෙමගින් සිදුවේ.

කන් ආසාදන ඉහත කී කොටස් 3න් ඕනෑම එකක ඇතිවිය හැකි අතර විශේෂයෙන් කුඩා ළමුන්ගේ සුළඟ වන්නේ මරු කන් ආසාදන හෙවත් Otitis media යන්නයි.

බැක්ටීරියා, වෛරස් හෝ දිලීර ආසාදන යන තුන් වර්ගයම මීට හේතු කාරක විය හැක.

කන් ආසාදන වල රෝග ලක්ෂණ මොනවාද ?

ආසාදිත ස්ථනය හා හේතු කාරක වන ක්‍රමය අනුව රෝග ලක්ෂණ වෙනස්විය හැක. නමුත් පහත සඳහන් රෝග ලක්ෂණ ඉතා සුලභය.

- කන් වේදනාව
- කන් ඇසීමේ අඩු බවක් ඇතිවීම
- කණින් ප්‍රාවයක් පිටවීම
- උණ
- නියර්දය
- කළු රුචිය ඇඹුවීම හා ඔක්කාර ගතිය (Nausea)

- කන ඇතුළත හා අවට කැසීම
- කන් පෙත්ත හා කාලය මත සැරව බිබිලි ඇතිවීම
- කන ඇතුළත දෝංකාර දීම වැනි ශබ්ද ඇසීම
- Vertigo - කරකැවිල්ල

කන් ආසාදන ඇති වීමට හේතු කාරක මොනවාද ?

අපගේ කන ඉයුස්ටේකියා නාලය (Eustachian Tube) මගින් නාසයේ පීටිපස කොටස හා සම්බන්ධ වේ. එමගින් කන ඇතුළත හා පිටත වාතය සමතුලිත කිරීම හා මරු කන් සිට ප්‍රාවයන් උගුරට ගෙන ඒම සිදු කෙරේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙම නාලයේ බිත්ති එකිනෙක මත තෙරපී පවතින අතර බැක්ටීරියා ඇතුළු ආසාදන කාරක උගුරේ හා නාසයේ සිට මරු කනට ඇතුළුවීම වලක්වයි. මෙම කාලය අවහිර වෙතොත් මරු කන ඇතුළත ප්‍රාවයන් හා බැක්ටීරියා වර්ධනය වී මරු කන් ආසාදන ඇති කරයි.

කන් ආසාදන ඇතිවීමට බලපාන සමහර හේතු කාරක හා අවදානම් සාධක පහතින් දැක්වේ.

- සෛම්ප්‍රතිශ්‍යාව, උගුරේ ආසාදන වැනි ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝගාබාධ
- වායු පීඩනයේ ඇතිවන ක්ෂණික වෙනස්වීම්
- උදා:- ගුවන් ගමන්
- කුඩා හෝ අවහිරවූ ඉයුස්ටේකියා නාල පැවතීම
- Cleft palate නැමැති උපතින් ඇතිවන ආබාධය
- කුඩා ළමුන් අපවිත්‍ර ජලයේ පිහිටීම
- පිහිනීමෙන් පසු පිටත කන නිසි පරිදි වියළීමට අනපසු වීම
- උවමනාවට වඩා කන පිරිසිදු කිරීමෙන් කන සිඳීම

කන් ආසාදන රෝග නිර්ණය කරගන්නේ කෙසේද ?

- රෝග ලක්ෂණ හා රෝග ඉතිහාසය මගින්
- ඔබගේ වෛද්‍යවරයා Otoloscope නැමැති උපකරණයක් මගින් කන ඇතුළත පරීක්ෂා කර බැලීම මගින්

කන් ආසාදන සඳහා කරන ප්‍රතිකාර මොනවාද?

මේ සඳහා කරන ප්‍රතිකාර විවිධ කන් ආසාදන වර්ගය අනුව වෙනස් වේ.

ප්‍රධාන ආසාදන වර්ග 2 වන පිටත කන් ආසාදන හෙවත් Otitis Externa හා මරු කන් ආසාදන හෙවත් Otitis Media සඳහා කරන ප්‍රතිකාර පහතින් සාකච්ඡා කරමු.

Otitis Externa

කන් බේරියට පිටපතින් ඇති නාලයේ ඇතිවන ආසාදන හා ඉදිමීම නිසා මෙය හට ගනී. අපිරිසිදු වතුරට නිරාවරණයවීම හා උවමනාවට වඩා කන පිරිසිදු කිරීමට යෑම මෙයට හේතුවන ප්‍රධාන කරුණු දෙකයි. ආසාදනය බොහෝ විට බැක්ටීරියා හා දිලීර මගින් සිදුවේ.

මේ සඳහා ඇති ප්‍රතිකාර නම්

- නියමාකාරව කන පිරිසිදු කිරීම මගින් අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම
- ප්‍රතිජීවක හා ස්ටෙරොයිඩ් අඩංගු දියර ප්‍රතිකාර (Clear Drops)
- ප්‍රතිජීවක පෙති හා කරල් (Oral antibiotics)
- දිලීර නාශක අඩංගු (ear Drops) දියර
- වේදනා නාශක ප්‍රතිකාර
- කන තෙතමනය රහිතව වියළීමට තබා ගැනීම

Otitis media

බොහෝ විට සෛම්ප්‍රතිශ්‍යාව වැනි ආසාදන වලින් පසු හා යුස්ටේකියා අවහිර වීම නිසා කුඩා ළමුන්ගේ හට ගන්නා රෝග තත්වයකි.

ක්ෂණිකව ඇතිවන (Acute) හා නිදහස් (Chronic) යනුවෙන් වර්ග දෙකක් පවතී.

සමහර විට කන් බේරිය පුපුරා යාමද සිදුවිය හැක. නමුත් බොහෝ අවස්ථාවලදී එය නැවත යථා තත්වයට පත්වීම සිදුවේ.

මේ සඳහා කෙරෙන ප්‍රතිකාර නම්

- වේදනා නාශක
- ප්‍රතිජීවක ඖෂධ (Antibiotics)
- Ear drops - කන තුළ සැරව පවති නම්

නිතර නිතර මෙවන් Acute Otitis media නැමැති ආසාදන ඇතිවීම නිදහස්වන ආසාදන (Chronic Otitis media) ඇතිවීමට හේතුවක් වේ. එමගින් කන් බේරිය පුපුරා යෑම, මරු කන් ඇති සියුම් අවයව වලට හානි පැමිණීම සිදුවිය හැකිය.

මෙහි අතුරු ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මෙහි න්පයිරිස් (meningitis) නැමැති මොළයේ ඇතිවන ආසාදනය Labyrinthitis නැමැති ශ්‍රවණයේ තුලනය පාලනය කරන අවයවයේ ආසාදනය බිහිරි බව (Deafness) යනාදිය කලාතුරකින් ඇතිවිය හැකිය.

එබැවින් ඔබට හෝ ඔබගේ ළමුන්ට කන් ආසාදනයක් පවතින බවට සැකයක් ඇති වූ විටය පවුලේ වෛද්‍යවරයා හමුවී පරීක්ෂා කරවා ගෙන ප්‍රතිකාර ගැනීම හා වලක්වා ගැනීමේ උපදෙස් ලබා ගැනීම වැදගත්ය.