

ඇදුම් රෝගය හඳුනා ගනිමු (Asthma)



සිස්ටේමිකවේ සෑම වැඩිහිටියෙක් දස දෙනෙකුගෙන් අයෙකුට හා ළමුන් නවදෙනෙකුගෙන් අයෙකුට ඇදුම් රෝගය ඇති බවට හඳුනාගෙන ඇත.

ඇතුළත් : Combined Inhalers) ප්‍රතිකාරය පාවිච්චි කිරීමට සිදුවේ.

උදා: Symbicort Seretide.

එසේම රෝගය උත්සන්න වූ අවස්ථාවලදී ස්ටීරොයිඩ් වර්ගයේ පෙති (උදා: Prednisolone) හෝ එන්නත් (උදා: Hydrocortisone injection) පාවිච්චි කිරීමට ඔබගේ වෛද්‍යවරයා විසින් නියම කරනු ලැබේ.

බොහෝවිට යම්කිසි ආසාදිතතාවයකට (Allergy) නිරාවරණය වීම නිසා සිදුවේ.

උදාහරණයක් ලෙස ශාකවල පරාග (Pollen) වලට නිරාවරණය වීම.

පසුගියදා මගත් ආන්දෝලනයට තුඩු දුන් Asthma Thunder Storm නිළි සිදුවූයේද මෙයයි. අධික සුළඟ නිසා Pollen වාතයේ වැඩිපුර පිසිරීමෙන් එය ආශ්වාස කළ බොහෝ දෙනෙකුට රෝගය උත්සන්න විය.

ඇදුම් රෝගය පාලනය කරන්නේ කෙසේද?

ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා නිතිපතා හමුවී රෝගයේ පාලනය පරීක්ෂා කරවා ගැනීම වැදගත්ය. එසේම ඔබ නිවැරදිව Inhaler උපකරණය පාවිච්චි කරයිද යන්න පරීක්ෂා කරවා ගැනීම සිදු කළ යුතුය. මත්තිසාද යත් බොහෝ රෝගීන්ගේ රෝගය උත්සන්න වීමට එක් හේතුවක් වන්නේ නිවැරදිව Inhalers පාවිච්චි නොකිරීමය.

- ගැබ්ගත් දුර්වල රෝගය උත්සන්න කරවන සාධක වලට නිරාවරණය නොවී සිටීම.
- ප්‍රතිකාර නියම කරන ලද මාත්‍රාව හා කාලය තුළ නිසි ලෙස පාවිච්චි කිරීම, විශේෂයෙන් Tn Preventer වර්ගයේ ඖෂධ පාවිච්චි කරන්නේ නම් රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් නොකළද ඔබගේ වෛද්‍යවරයා විසින් නියම කරන ලද කාලය දක්වා නොකඩවා පාවිච්චි කළ යුතුය.
- එසේම රෝගය සදාතා ගන්නා ඖෂධ, රෝග ලක්ෂණ හඳුනා ගන්නා ආකාරය, රෝගය උත්සන්න වීමකදී කළ යුතු දෑ ආදිය අඩංගු ලේඛනයක් හෙවත් Asthma Action Plan එකක් ඔබගේ වෛද්‍යවරයා සමඟ සාකච්ඡාකර පිළියෙල කර ගැනීම වැදගත්ය. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දරුවන් හට ඇදුම් රෝගය පවති නම් එවැනි ලේඛනයක් පාසලට භාරදීමට සිදුවනු ඇත.

රෝගය උත්සන්න වීමකදී (Asthma attack) කළ යුත්තේ කුමක්ද?

- ඇදුම් උත්සන්න වීම දෙයාකාරයකින් සිදුවිය හැකිය.
- 1 කුමනුකුලව රෝග ලක්ෂණ උත්සන්න වී තදබල රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන තත්ත්වයට පත්වීම.
 - 2 ක්ෂණිකව රෝගය උත්සන්න වීම. මෙය

රෝගය උත්සන්න වීමේදී සැලකිය යුතු රෝග ලක්ෂණ මේවායි.

- කැස්ස, ගතිය, පපුව තදවීම, හා උයාස්සට වැටී රෝග ලක්ෂණ අධික ලෙස උත්සන්න වීම.
- රාත්‍රී කාලයේ රෝගය උත්සන්න වී නින්දෙන් අවදිවීම.
- සැකසූ සාධක මත සැකසූ සාධක ආදිය වැඩිපුර ගැනීමට සිදුවීම හා රෝග ලක්ෂණ ඒ මගින් පාලනය නොවීම.

මේවැනි තදබල රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් අවස්ථාවකදී නිසි ලෙස ප්‍රතිකාර නොකළහොත් මාරාන්තික විය හැක. පසුගියදා ඇති වූ ඔයමඔ-ෆර් එදරප නිළි පුද්ගලයන් 8 දෙනෙකු පමණ මිය ගිය බව සිහිපත් කළ යුතුය.

ඉහත කී ආකාරයේ උත්සන්න වීමේදී Asthma Action Plan නි ඇති ආකාරයට ප්‍රතිකාර ගැනීම සිදු කළ යුතුය.


4 Puffs every 4 minutes.

එසේම ඇමිබියුලෝස් ස්ටීරොයිඩ් අමනා (000) ඇදුම් රෝගය උත්සන්නවී ඇති බව දැක්වීම සුදුසුය.

විශේෂයෙන්ම පහත රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන විටදී රෝගලක්‍ෂණ වහාම ඇතුළු වීම කළ යුතුය.

- හුස්ම ගැනීම තද බල ලෙස අපහසු වීම.
- පහසුවෙන් වාතයෙන් කතා කිරීමට අපහසු වීම.
- තොල් පෙති නිල් පැහැයට හැරීම.
- Reliever ප්‍රතිකාරය සාර්ථක නොවීම.

මේවැනි අවස්ථාවක නිලත් රටක් සැමිණෙන තුරු නොකඩවා ඉහත කී 4 puffs / 4 minutes. මාත්‍රාව පාවිච්චි කළ යුතුය.



වෛද්‍ය හර්ෂ ඇල්ත්ගේ
Dr Harsha Aluthge
MBBS, FRACGP, DFM RCGP(UK)
General Practitioner
Greenvale Medical Centre

පසුගිය දිනවල මෙලබර්න් අවට ප්‍රදේශවල හටගත් "Asthma Thonder Storm" නමැති මගත් ආන්දෝලනයට තුඩු දුන් ඇදුම් රෝගයේ අධික උත්සන්න වීමේ තත්ත්වය තුළ සමාජයේ බොහෝ දෙනාගේ දැඩි කනාබහට ලක් වූ රෝගී තත්ත්වයක් බවට ඇදුම් රෝගය පත්වී තිබේ.

එබැවින් කාලීන මාතෘකාවක් ලෙස අද අපි ඇදුම් රෝගය පිළිබඳව වැඩි දුර විස්තර සාකච්ඡා කරමු.

ඇදුම් රෝගය යනු කුමක්ද ?

මෙය අපගේ ශරීරයේ ශ්වසන පද්ධතියේ (විශේෂයෙන් පෙනහළු වල) ඇති වාතය සංසරණය වන නාල වල ඇති වන රෝගී තත්ත්වයකි. එම නාල වල ජීවත් සෂාවීමෙන් හා ඉදිමීමෙන් (inflammation) හා සම ස්‍රාවය වීම මගින් නාල අවහිරවී හුස්ම ගැනීමට අපහසු වීම රෝගයේදී දක්නට ලැබේ.

බොහෝ දෙනෙකුට රෝගය උත්සන්න කරවන රෝග කාරකයක් (Trigger Factor) හඳුනා ගත හැක. උදාහරණ වශයෙන් අධික වෛරස් ආසාදන (Cold and Flu) යන කාලගුණය ආදිය.

එසේම ඇදුම් රෝගය අනෙකුත් සුළඟ ආසාදිත රෝග (Allergic conditions) වන Hay Fever හා Eczema ඇති අයට වැඩිපුර වැළඳීමේ අවධානමක් ඇත.

ඇදුම් නිරෝධානීන් සුව කිරීම අපහසු වුවද රෝගය ඉතා හොඳින් පාලනය කරගෙන සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කළ හැකිය.

ඇදුම් රෝගය සිස්ටේමිකවේ සමාජය තුළ සුළඟම නිදහ්‍යතා රෝගී තත්ත්වයකි. සෑම වැඩිහිටියෙක් දස දෙනෙකුගෙන් අයෙකුට හා ළමුන් නවදෙනෙකුගෙන් අයෙකුට ඇදුම් රෝගය ඇති බවට හඳුනාගෙන ඇත.

ඇදුම් රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ මොනවාද ?

- පපුවේ ඇතිවන තද ගතිය.
- හුස්ම ගැනීමට අපහසු වීම.
- කැස්ස.
- Wheezing නැමැති ප්‍රාස්වාස කරනවිට ඇතිව ශබ්දය.
- ගතිය (Shortness of breath)

සාමාන්‍යයෙන් ඉහත කී රෝග ලක්ෂණ රාත්‍රී කාලයේදී හා උදෑසන හෝ වාතාශ්‍රයක යෙදෙන අවස්ථාවල උත්සන්න වීමක් දක්නට ලැබේ.

ඇදුම් රෝගය සඳහා හේතු කාරක කවරේද? (Trigger factors)

මෙම හේතු කාරක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වේ. සමහර විට එවැනි හේතු කාරකයකට පැහැදිලිව හඳුනා ගත නොහැකි වීමටද හැකිය.

පහත සඳහන් වන්නේ සුළඟ හේතුකාරක කිහිපයකි.

- ආසාදිතතා (Allergies), Pollen, House dust, Mile, දිලීර , සත්ව ලෝම ආදිය.
- දුම් පානය.
- වෛරස් ආසාදන (cold and flu)
- ශීත කාලගුණය.
- රැකියා ආශ්‍රිත සාදක උදා: උදදා ෦෯ රසායන ද්‍රව්‍ය, ලුම්.
- සමහර ඖෂධ වර්ග.

ඇදුම් රෝගය සඳහා ඇති ප්‍රතිකාර මොනවාද?

ප්‍රධාන ප්‍රතිකාර වර්ග දෙකකි.

1 රෝග ලක්ෂණ පාලය කරන ප්‍රතිකාර හෙවත් Symptom Relievers - මේවා බොහෝ විට සබ්-යකට නොවත් ජමයේ ලෙස පවතී. උදා: සැබ-එදකයක මෙම ඖෂධ පාවිච්චි කළ විට ඉක්මනින් ශ්වාස නාල වල මාංශපේශි දිනිල් කර අවහිරතාවය මග හරවයි. එමගින් විනාඩි කිහිපයක් තුළ හුස්ම ගැනීම පහසු වීම සිදු වේ.

ඇදුම් රෝගය උත්සන්න වූ අවස්ථා වලදී පාවිච්චි කළ යුත්තේ මෙම ප්‍රතිකාර වර්ගයකි.

2 රෝගය නිතර වැළඳීම වළක්වන ප්‍රතිකාර හෙවත් Preventers උදා: Flixotide Inhaler

මෙම ප්‍රතිකාර මගින් ශ්වාස නාල වල රෝග කාරක වලට සංවේදීතාව අඩු කරයි. එසේම නාල වල ඉදිමීම අඩුකර එමගින් රෝගය දිගුකාලීනව පාලනය කිරීම හා නිතර උත්සන්න වීම වළක්වයි.

සමහර විට මෙම ඖෂධ වර්ග දෙකේ සංකලනයක්